SilverSense SDF®

38% Silver Diamine Fluoride

For Caries Arrest

Instructions for use

NPN 80136256



Description:
5 mL amber dropper bottle of SilverSense SDF solution. Dosage of 0.03 mL per drop. Product forms insoluble precipitates with calcium or phosphate in the dentinal tubules to block nerve impulses. Arrests the continuation of caries.

Uses:
• Helps with the treatment of dentinal sensitivity • Anti-caries • Prevents, fights and/or protects against cavities or caries • Arrests the progress of an already formed cavity in primary teeth • Arrests the continuation of a cavity that has already formed in primary teeth • Helps arrest the progress of an already formed cavity in permanent teeth • Helps arrest the continuation of a cavity that has already formed in permanent teeth. Helps to temporarily reduce (painful) tooth sensitivity due to air exposure in adults.

Contraindications:
1. Patients with ulcerative gingivitis or stomatitis or known sensitivity to silver or other heavy-metal ions.
2. Patients having had full mouth gingivectomies.
3. Patients showing abnormal skin sensitization in daily circumstances.

Directions For Use:
Adults and Children 3 years and older: Use 1-2 drops per patient (0.03 ml per drop). For professional use only.
1. Isolate the affected tooth.
2. Clean and dry the affected tooth surface.
3. Dispense 1-2 drops of solution into a disposable dappen dish (treats up to 5 sites per patient). Transfer material directly to the tooth surface with the supplied Benda® Micro applicator. Use care to avoid getting the solution onto soft tissue or spilling on counters or clothing.
4. Allow to air dry for 60 seconds, do not rinse. If needed, one or two re-applications may be administered at intervals of one week.
5. Do not eat or drink 30-60 minutes after treatment.

Note:
When possible, we suggest removing soft infected dentin with an excavator, or similar instrument, to reduce the potential for staining.

Warnings:
SilverSense SDF is intended for local application only. Not for ingestion. Protect the patient's eyes. Use caution to avoid contact with skin or clothing. In the event of exposure to eyes or skin, flush the area copiously with water and immediately seek medical consultation. Treatment can cause lesions (cavities) in teeth to be permanently stained dark brown or black. Do not use in patients with oral soft tissue ulcerations.

Adverse Reactions:
1. SilverSense SDF does not normally stain enamel or burnished dentin. Advise patients that soft dentin or margins of composite restorations may be stained. Staining may be reversed by gentle polishing with a tincture of iodine (weak iodine solution).
2. Advise patients that air-drying and product application can cause momentary transient pain to hypersensitive areas.
3. Minimize product contact with gingiva and mucous membrane by using recommended amounts and careful application, as transient but rare irritation of the gingiva has been reported. Apply petroleum jelly or cocoa butter, or use cotton rolls, to protect the gingival tissues. Alternatively, a rubber dam can be used to isolate the area.

Precautions For Handling:
1. Store in original packaging in a cool, dark place. Do not freeze or expose to extreme heat.
2. Replace cap immediately after use. Use as soon as dispensed.
3. SilverSense SDF will stain skin, clothes, countertops, floors and instruments brown or black. Refer to the following for stain removal:
   - Skin; wash immediately with water, soap, ammonia or iodine tincture and then rinse thoroughly with water. Do not use excessive methods in an attempt to remove difficult stains from skin as the stains will eventually fade.
   - Clothing/Countertops/Floors/Instruments; use the same procedure as with stained skin. Difficult stains may be treated with sodium hypochlorite.
   - Use caution to avoid transferring the material from gloved hands to other surfaces.
4. After SilverSense SDF is dispensed, dispose of or be sure to wash or thoroughly wipe the container clean immediately after use
5. SilverSense SDF has a blue tint to increase visibility in dappen dish.
6. When dosing, ensure SilverSense SDF is kept separate and not confused with other colored liquids, such as etchants and tooth conditioners.

Medicinal Ingredients:
Silver 25.5% w/v(Silver Diamine Fluoride), Fluoride 4.5% w/v (Silver Diamine Fluoride)

Non-Medicinal Ingredients:
Distilled Water, Fast Green FCF, Ammonium hydroxide.

Visit centrixdental.com/IFU-SDS For Safety Data Sheet

SilverSense SDF®

Fluorure diamine d'argent à 38 %

Mode d'emploi

NPN 80136256



Pour arrêter la progression de la caries

Description :
Flacon compte-gouttes ambre de 5 mL contenant la solution SDF SilverSense. Dose de 0,03 mL par goutte. Le produit forme des précipités insolubles avec du calcium ou du phosphate dans les tubules dentinaires afin de bloquer l'influx nerveux. Freine la progression de la carie.

Utilisations :
• Aide au traitement de la sensibilité dentaire • Prévention de la carie • Prévient, combat et/ou protège contre les caries et les caries • Stoppe la progression d'une carie existante sur les dents primaires • Stoppe l'évolution d'une carie qui s'est déjà formée sur les dents primaires • Aide à stopper la progression d'une carie existante sur les dents permanentes • Aide à stopper l'évolution d'une carie qui s'est déjà formée sur les dents permanentes. Aide à réduire temporairement la sensibilité (douloureuse) des dents due à l'exposition à l'air chez les adultes.

Contre-Indications :
1. Patients atteints de gingivite ou de stomatite ulcéreuse ou d'une sensibilité connue à l'argent ou à d'autres ions de métaux lourds.
2. Les patients ayant subi une gingivectomie complète de la bouche.
3. Patients présentant une sensibilisation cutanée anormale dans des circonstances quotidiennes.

Mode D'Emploi :
Adultes et enfants de 3 ans et plus : Utilisez 1 à 2 gouttes par patient (0,03 mL par goutte). Réservé à un usage professionnel.
1. Isolez la dent affectée.
2. Nettoyez et séchez la surface de la dent affectée.
3. Versez 1 à 2 gouttes de solution dans un godet Dappen jetable (permet de traiter jusqu'à 5 sites par patient). Appliquez le produit directement sur la surface de la dent à l'aide de l'applicateur BendaMD Micro fourni. Veillez à éviter que la solution n'entre en contact avec les tissus mous ou ne se renverse sur les surfaces de travail ou les vêtements.
4. Laissez sécher à l'air pendant 60 secondes; ne pas rincer. Au besoin, une ou deux réapplications peuvent être réalisées à une semaine d'intervalle.
5. Ne pas manger ni boire dans les 30 à 60 minutes après le traitement.

Remarque :
Dans la mesure du possible, nous suggérons de retirer la dentine infectée par un excavateur, ou un instrument similaire, afin de réduire le risque de coloration.

Avertissements :
SilverSense SDF est destiné à une application locale uniquement. Ne pas ingérer. Protégez les yeux du patient. Veillez à éviter tout contact avec la peau ou les vêtements. En cas de contact avec les yeux ou la peau, rincez abondamment la région affectée avec de l'eau et consultez immédiatement un médecin.
Le traitement peut tacher de façon permanente la surface dentaire (caries) traitée en noir ou en brun foncé.
Ne pas utiliser chez les patients présentant des ulcérations buccales aux tissus mous.

Effets Indésirables :
1. SilverSense SDF ne tache généralement pas l'émail ou la dentine polie. Informez les patients que la dentine molle ou les marges de restauration composite peuvent être tachées. Les taches peuvent être éliminées par un polissage doux avec une teinture d'iode (solution d'iode diluée).
2. Avisez les patients que le séchage à l'air et l'application du produit peuvent causer une douleur transitoire momentanée dans les zones hypersensibles.
3. Minimisez le contact du produit avec la gencive et la muqueuse en utilisant les quantités recommandées et en appliquant le produit avec précaution, car une irritation transitoire mais rare de la gencive a été signalée. Appliquez de la vaseline ou du beurre de cacao, ou utilisez des rouleaux de coton pour protéger les tissus gingivaux. Vous pouvez également utiliser une digue dentaire pour isoler la zone.

Précautions de Manipulation :
1. Conserver dans son emballage d'origine, dans un endroit frais et sombre. Ne pas congeler ni exposer à une chaleur extrême.
2. Remettre le bouchon en place immédiatement après utilisation. Utiliser le produit dès qu'il est préparé.
3. SilverSense SDF peut tacher la peau, les vêtements, les surfaces de travail, les planchers et les instruments en brun ou en noir. Pour enlever les taches, reportez-vous à ce qui suit :
   - Peau; lavez immédiatement avec de l'eau, du savon, de l'ammoniaque ou une teinture d'iode, puis rincez abondamment à l'eau. N'utilisez pas de méthodes excessives pour tenter d'éliminer les taches tenaces sur la peau, car elles finiront par s'estomper.
   - Vêtements, surfaces de travail, planchers et instruments; suivez la même procédure d'élimination des taches sur la peau. Les taches tenaces peuvent être traitées avec de l'hypochlorite de sodium.
   - Veillez à ne pas transférer le matériau des mains gantées vers d'autres surfaces.
4. Après avoir utilisé la solution SilverSense SDF, jetez ou assurez-vous de laver ou de bien essuyer le contenant immédiatement après utilisation
5. SilverSense SDF a une teinte bleue pour améliorer sa visibilité dans le godet Dappen.
6. Lors du dosage, veillez à ce que SilverSense SDF soit bien séparé et ne soit pas confondu avec d'autres liquides colorés, comme les mordants et les conditionneurs dentaires.

Ingrédients Médicinaux :
Argent à 25,5 % p/v (fluorure diamine d'argent), fluorure à 4,5 % p/v (fluorure diamine d'argent)

Ingrédients Non Médicinaux :
Eau distillée, vert rapide FCF, hydroxyde d'ammonium.

Visitez Le Site centrixdental.com/IFU-SDS Pour Consulter La Fiche De Données De Séurité

CENTRIX INCORPORATED
770 River Road
Shelton, CT 06484 USA
Toll Free (USA): 800.235.5862
CENTRIXDENTAL.COM

IMPORTED BY | IMPORTÉ PAR :
Quality Import Solutions Inc.
Burlington, ON L7L 6A3

centrix®
MAKING DENTISTRY EASIER®

© 2026 Centrix, Inc. | Date Revised: 2026/06 | 012240C REV A