SilverSense SDF®

38% Silver Diamine Fluoride

Product Facts

Medicinal Ingredients

Silver 25.5% w/v (Silver Diamine Fluoride)
Fluoride 4.5% w/v (Silver Diamine Fluoride)

Uses

Helps with the treatment of dentinal sensitivity • Anti-caries • Prevents, fights and/or protects against cavities or caries • Effective decay preventive fluoride • Helps reverse the tooth decay process at the earliest stage before it can become a cavity. Arrests the progress of an already formed cavity in primary teeth • Arrests the continuation of a cavity that has already formed in primary teeth • Helps arrest the progress of an already formed cavity in permanent teeth • Helps arrest the continuation of a cavity that has already formed in permanent teeth. Helps to temporarily reduce (painful) tooth sensitivity due to air exposure in adults. When combined with regular dental hygiene (including brushing, flossing, and regular professional cleanings) arrests the progress of an already formed cavity • When combined with regular dental hygiene (including brushing, flossing, and regular professional cleanings) arrests the continuation of a cavity that has already formed.

Warnings

SilverSense SDF is intended for local application only. Not for ingestion. Protect the patient's eyes. Use caution to avoid contact with skin or clothing. In the event of exposure to eyes or skin, flush the area copiously with water and immediately seek medical consultation. Treatment can cause lesions (cavities) in teeth to be permanently stained dark brown or black. Do not use in patients with oral soft tissue ulcerations.

Directions

Adults and Children 3 years and older: Use 1-2 drops per patient (0.03 ml per drop). For professional use only.
1. Isolate the affected tooth.
2. Clean and dry the affected tooth surface.
3. Dispense 1-2 drops of solution into a disposable dappen dish (treats up to 5 sites per patient). Transfer material directly to the tooth surface with the supplied Benda® Micro applicator. Use care to avoid getting the solution onto soft tissue or spilling on counters or clothing.
4. Allow to air dry for 60 seconds, do not rinse. If needed, one or two re-applications may be administered at intervals of one week.
5. Do not eat or drink 30-60 minutes after treatment.

Other information

Store at 15-25°C.

Non-medicinal ingredients

Distilled Water, Fast Green FCF, Ammonium hydroxide.

Questions? 1.800.235.5862 centrixdental.com

SilverSense SDF®

Fluorure diamine d'argent à 38 %

Info-produit

Ingrédients médicinaux

Argent à 25,5 % p/v (fluorure diamine d'argent)
Fluorure à 4,5 % p/v (fluorure diamine d'argent)

Usages

• Aide au traitement de la sensibilité dentaire • Prévention de la carie • Prévient, combat et/ou protège contre les caries ou les caries • Fluorure efficace pour la prévention des caries • Contribue à inverser le processus de carie dentaire à son stade initial, avant qu'il ne devienne une carie. Stoppe la progression d'une carie existante sur les dents primaires • Stoppe l'évolution d'une carie qui s'est déjà formée sur les dents primaires • Aide à stopper la progression d'une carie existante sur les dents permanentes • Aide à stopper l'évolution d'une carie qui s'est déjà formée sur les dents permanentes. Aide à réduire temporairement la sensibilité (douloureuse) des dents due à l'exposition à l'air chez les adultes. Lorsqu'il est utilisé en complément d'une hygiène dentaire régulière (incluant le brossage, l'utilisation de la soie dentaire et les nettoyages professionnels réguliers), il stoppe la progression d'une carie existante • Lorsqu'il est utilisé en complément d'une hygiène dentaire régulière (incluant le brossage, l'utilisation de la soie dentaire et les nettoyages professionnels réguliers), il stoppe l'évolution d'une carie existante.

Mises en garde

SilverSense SDF est destiné à une application locale uniquement. Ne pas ingérer. Protégez les yeux du patient. Veillez à éviter tout contact avec la peau ou les vêtements. En cas de contact avec les yeux ou la peau, rincez abondamment la région affectée avec de l'eau et consultez immédiatement un médecin. Le traitement peut tacher de façon permanente la surface dentaire (caries) traitée en noir ou en brun foncé. Ne pas utiliser chez les patients présentant des ulcérations buccales aux tissus mous.

Mode d'emploi

Adultes et enfants de 3 ans et plus : Utilisez 1 à 2 gouttes par patient (0,03 mL par goutte). Réservé à un usage professionnel.
1. Isolez la dent affectée.
2. Nettoyez et séchez la surface de la dent affectée.
3. Versez 1 à 2 gouttes de solution dans un godet Dappen jetable (permet de traiter jusqu'à 5 sites par patient). Appliquez le produit directement sur la surface de la dent à l'aide de l'applicateur Benda[MD] Micro fourni. Veillez à éviter que la solution n entre en contact avec les tissus mous ou ne se renverse sur les surfaces de travail ou les vêtements.
4. Laissez sécher à l'air pendant 60 secondes; ne pas rincer. Au besoin, une ou deux réapplications peuvent être réalisées à une semaine d'intervalle.
5. Ne pas manger ni boire dans les 30 à 60 minutes après le traitement.

Autres renseignements

Conservez à une température comprise entre 15 et 25 °C.

Ingrédients non médicinaux

Eau distillée, vert rapide FCF, hydroxyde d'ammonium.

Questions? 1.800.235.5862 centrixdental.com

© 2026 Centrix, Inc. | Date Revised: 2026/07 | 013848C REV A

IMPORTED BY | IMPORTÉ PAR :
Quality Import Solutions Inc.
Burlington, ON L7L 6A3

CENTRIX INCORPORATED
770 River Road
Shelton, CT 06484 USA
Toll Free (USA): 800.235.5862
CENTRIXDENTAL.COM

centrix®
MAKING DENTISTRY EASIER®